

## Algebra zbiorów

1. Wyznacz elementy zbioru:

- (a)  $A = ((-5, 6] \setminus \{-2, 3\}) \cap \mathbb{Z}$ ,
- (b)  $B = ((-5, 6] \setminus [-2, 3]) \cap \mathbb{N}$ ,
- (c)  $C = (\{-5, 3\} \setminus [-2, 3]) \cap \mathbb{R}_+$ ,
- (d)  $D = (\{-5, 3\} \cap \mathbb{R}_+) \cup ([-2, 3] \cap \mathbb{Z}_-)$ .

2. Rozważmy algorytm:

$$\text{Alg} = \{x := 0; y := 0; \text{ while } x^2 \leq 50 \text{ do } x := x + 1; y := x \text{ div } 2 \text{ od}\}.$$

Wypisz

- (a) wybrane zbiory,
- (b) wybrane ciągi,

jakie można utworzyć korzystając z (nie koniecznie wszystkich) liczb naturalnych  $y$  osiągalnych poprzez wykonanie tego algorytmu, z uwzględnieniem krotności ich występowania. Czy liczba otrzymanych zbiorów odpowiada liczbie uzyskanych ciągów?

3. Liczby naturalne można definiować jako zbiory stosując następującą definicję von Neumanna:

$$0 \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset, \quad 1 \stackrel{\text{def}}{=} \{0\}, \quad n + 1 \stackrel{\text{def}}{=} \{0, 1, \dots, n\}.$$

Na przykład  $2 = \{0, 1\} = \{\emptyset, \{0\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ . Korzystając z tej definicji

- (a) wyznacz liczby 3, 4, 5,
- (b) zaproponuj algorytm obliczający liczbę naturalną  $n$ ,
- (c) zaproponuj algorytm wyznaczający  $n$  pierwszych liczb naturalnych.

4. Rozważmy następujący algorytm:

$$\text{Alg}(A, n) = \{ \text{ if } n > 0 \text{ then } A := P(\text{Alg}(A, n - 1)); \text{ fi return } A \}.$$

Wyznacz końcową wartość zbioru  $A$  uzyskaną po wykonaniu algorytmu:

- (a)  $\text{Alg}(\emptyset, 0)$ ,
- (b)  $\text{Alg}(\{0, 1\}, 2)$ ,
- (c)  $\text{Alg}(\emptyset, 3)$ .

Jaka jest moc  $\text{Alg}(\emptyset, k)$ ?

5. Ile elementów ma zbiór:

- (a)  $E = \{x : x \in \mathbb{N}, x \text{ jest wielokrotnością } 4 \text{ i } x < 50\}$ ,
- (b)  $F = \{2 + (-1)^n : n \in \mathbb{N}\}$ ,
- (c)  $G = \{3z + 1 : z \in \mathbb{Z} \text{ i } |z| < 4\}$ ,
- (d)  $H = \emptyset$ ,
- (e)  $I = \{\emptyset\}$ ,
- (f)  $J = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ ,
- (g)  $K = \{\emptyset, \emptyset, \emptyset\}$ ?

Ile podzbiorów ma każdy z wymienionych zbiorów?

6. Wyznacz zbiory potęgowe zbiorów  $\emptyset$ ,  $\{\emptyset\}$ ,  $\{a\}$ ,  $\{0, 10, 11\}$ .

7. Rozważmy program  $Pr_1(n) = \{x := 0; y := 0; \text{while } y < 20 \text{ do } y := x + 1; x := y \cdot n \text{ od}\}$ . Niech  $X(n)$  oznacza zbiór wszystkich wartości  $y$  osiągalnych poprzez wykonanie programu  $Pr_1(n)$ . Wyznacz zbiór potęgowy zbioru  $X(2) \cap X(3)$ .

8. Rozważmy następujące algorytmy:

$$Alg1(A, n) = \{ \text{if } n > 0 \text{ } A := Alg1(A, n - 1); \text{ fi } A := A \cup \{n\}; \text{ return } A \},$$

$$Alg2(B, n) = \{ \text{if } n > 0 \text{ } B := Alg2(B, n - 1); \text{ fi } B := B \oplus \{n\}; \text{ return } B \}.$$

Wypisz elementy zbiorów  $Alg1(\emptyset, 7)$  i  $Alg2(\mathbb{N}, 2)$  oraz wyznacz ich sumę, iloczyn, różnicę oraz dopełnienie przyjmując za uniwersum zbiór liczb naturalnych  $\Omega = \mathbb{N}$ .

9. Rozważmy program  $Pr_2(n) = \{x := 0; y := 0; \text{while } y \geq 0 \text{ do } y := y + 1; x := y \cdot n; \text{ od}\}$ . Niech  $\mathbb{N}(n)$  oznacza zbiór wszystkich wartości  $x$  osiągalnych poprzez wykonanie programu  $Pr_2(n)$ . Które z poniższych zależności są prawdziwe?

- (a)  $\mathbb{N}(2) \cap \mathbb{N}(3) = \mathbb{N}(6)$ ,
- (b)  $\mathbb{N}(3) \subset \mathbb{N}(6)$ ,
- (c)  $\mathbb{N}(6) \cup \mathbb{N}(3) = \mathbb{N}(3)$ ,
- (d)  $\mathbb{N}(2) \setminus \mathbb{N}(4) = \emptyset$ .

10. Niech  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$  i niech  $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, n - 1\}$ .

- (a) Czy zbiór  $\mathbb{Z}_5$  jest podzbiorem zbioru  $\mathbb{Z}_6$ ?
- (b) Wymień wszystkie elementy zbioru  $P(\mathbb{Z}_2)$ .
- (c) Czy zbiory  $A = (\mathbb{Z}_6 \setminus \mathbb{Z}_4) \cup \mathbb{Z}_3$  i  $B = \mathbb{Z}_5$  są równe?
- (d) Wyznaczyć  $\mathbb{Z}'_3$  przy założeniu, że zbiorem uniwersalnym jest  $\mathbb{Z}_{10}$ .

11. Niech  $\Sigma = \{a, b\}$ ,  $A = \{a, b, aa, bb, aaa, bbb\}$ ,  $B = \{w \in \Sigma^* : \text{długość}(w) \leq 2\}$  i  $C = \{w \in \Sigma^* : \text{długość}(w) \geq 2\}$  oraz niech  $\Sigma^*$  będzie zbiorem uniwersalnym. Wyznacz:

- (a)  $B', B' \cap C'$ ,
- (b)  $A \cap C, A \setminus C, \Sigma \setminus B$ ,
- (c)  $P(\Sigma)$ .

12. Rozważmy programy

$$Pr_3 = \{x := -2; \text{while } |x| < 3 \text{ do } x := x + 1; \text{ od}\},$$

$$Pr_4 = \{x := 0; y := 1; \text{while } y < 28 \text{ do } x := x + 1; y := 3^x \text{ od}\}.$$

Niech  $A$  oznacza zbiór wszystkich wartości  $x$  osiągalnych poprzez wykonanie programu  $Pr_3$  oraz niech  $B$  oznacza zbiór wszystkich wartości  $x$  osiągalnych poprzez wykonanie programu  $Pr_4$ . Wypisz lub narysuj elementy zbioru:

- (a)  $\{(m, n) \in A \times B : m < n\}$ ,
- (b)  $\{(m, n) \in B \times A : m < n\}$ ,
- (c)  $\{(m, n) \in A \times B : \min\{m, n\} < 0\}$ ,
- (d)  $\{(m, n) \in B \times A : m + n \text{ jest liczbą pierwszą}\}$ .

13. Wyznaczyć  $\bigcap_{t \in T} A_t$  oraz  $\bigcup_{t \in T} A_t$  gdy:

- (a)  $T = \{2, 3, 4\}$ ,  $A_t = \mathbb{Z}_t$ , gdzie  $\mathbb{Z}_t = \{0, 1, 2, \dots, t - 1\}$
- (b)  $T = \{1, 2, 3\}$ ,  $A_t = [t - 3, t + 1]$ .

14. Wyznaczyć  $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$  oraz  $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$  gdy:

- (a)  $A_n = \mathbb{Z}_n$ , gdzie  $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, n - 1\}$ ,
- (b)  $A_n = \mathbb{Z}(n)$ , gdzie  $\mathbb{Z}(n)$  oznacza zbiór wszystkich liczb całkowitych podzielnych przez  $n$ ,

- (c)  $A_n = [0, \frac{1}{n}]$ .
15. Udowodnić, że dla dowolnych rodzin  $\{A_t\}_{t \in T}$  oraz  $\{B_t\}_{t \in T}$ :
- (a)  $\bigcap_t (A_t \cap B_t) = \bigcap_t A_t \cap \bigcap_t B_t$ ,
- (b)  $\bigcup_t (A_t \cap B_t) \subseteq \bigcup_t A_t \cap \bigcup_t B_t$ .
16.  $A$  i  $B$  oznaczają zbiory niepuste. Jaki jest związek między tymi zbiorami, jeśli:
- (a)  $(A \cup B) \subseteq B$ ,
- (b)  $A \subseteq (A \cap B)$ ,
- (c)  $A \subseteq (A \setminus B)$ ,
- (d)  $A \cup B = B$ .
17. Czy istnieją zbiory  $A$ ,  $B$  i  $C$  takie, że  $A \cap B \neq \emptyset$ ,  $A \cap C = \emptyset$ ,  $(A \cap B) \setminus C = \emptyset$ ?
18. Wskaż, które ze zdań są prawdziwe, a które fałszywe. Dla każdego fałszywego zdania podaj kontrprzykład.
- (a) Jeśli  $A \cap B = A \cap C$ , to  $B = C$ .
- (b)  $(A \cap \emptyset) \cup B = B$  dla wszystkich zbiorów  $A$ ,  $B$ .
- (c)  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$  dla wszystkich zbiorów  $A$ ,  $B$ ,  $C$ .
19. Udowodnić, że dla dowolnych zbiorów  $A$ ,  $B$ ,  $C$ :
- (a)  $(A \cup B)' = A' \cap B'$ ,
- (b)  $A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$ ,
- (c)  $A \setminus (A \setminus B) = A \cap B$ ,
- (d)  $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ ,
- (e)  $A \cap B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq B' \cup C$ ,
- (f)  $(A \setminus B) \cup B = A \Rightarrow B \subseteq A$ .
20. Sprawdzić, czy dla dowolnych zbiorów  $A$ ,  $B$ ,  $C$  prawdziwe są następujące równości:
- (a)  $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ ,
- (b)  $A \cap (B \times C) = (A \cap B) \times (A \cap C)$ .
21. Różnicą symetryczną dwu zbiorów  $A$  i  $B$  nazywamy zbiór  $A \oplus B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ . Dowieść, że:
- (a)  $A \oplus B = B \oplus A$ ,
- (b)  $A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C)$ .