

Relacje

1. Wyznacz wszystkie elementy relacji $r \subseteq X \times Y$, gdy:
 - (a) $X = \{\text{pyton, sęp, struś}\}$, $Y = \{\text{zebra, gepard}\}$ oraz $x r y$ wttw, gdy słowo x nie ma ani jednej wspólnej litery ze słowem y ,
 - (b) $X = Y = \{0, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, 1\}$ oraz $x r y$ wttw, gdy $\frac{x}{y} \geq 1$.
2. Zapisz relację $r \subseteq U \times U$ jako (a) zbiór par uporządkowanych, (b) w postaci tabelki (macierzy) i (c) w postaci grafu. Określ jej własności.
 - (a) $U = \{-3, -2, 0, 1, 4, 5, 6\}$, $(n, m) \in r$ wttw $m^2 - n^2 \equiv 0 \pmod{3}$,
 - (b) $U = \{-12, -8, -2, -1, 0, 2, 4, 5, 6\}$, $(n, m) \in r$ wttw $n|m$ (n jest dzielnikiem m),
 - (c) $U = \{-10, -5, -4, -3, 1, 2, 4, 5\}$, $(n, m) \in r$ wttw $|n + m| < |m|$.
3. Jakie własności ma graf relacji określonej w zbiorze o skończonej liczbie elementów, jeśli relacja ta jest: (a) zwrotna, (b) symetryczna, (c) antysymetryczna, (d) spójna, (e) przechodnia, (f) relacją równoważności. Podaj odpowiednie przykłady.
4. Jakie własności ma tabelka relacji określonej w zbiorze o skończonej liczbie elementów, jeśli relacja ta jest: (a) zwrotna i symetryczna, (b) przeciwzwrotna i antysymetryczna. Podaj odpowiednie przykłady.
5. Sprawdź, które z własności: zwrotność, przeciwzwrotność, symetryczność, antysymetryczność, przeciwsymetryczność (asymetryczność), przechodniość, spójność posiada relacja $r \subseteq A \times A$ gdy:
 - (a) A - zbiór miast leżących w Azji, $r = \{(a, b) : a \text{ jest miastem położonym nie niżej nad poziomem morza niż miasto } b\}$,
 - (b) $A = \{x, y, z\}$, $r = \{(x, x), (y, x), (y, z), (z, z), (z, y)\}$,
 - (c) $A = 2^{\mathbb{N}}$, $r = \{(X, Y) : X \subseteq Y\}$,
 - (d) $A = \mathbb{N}$, $r = \{(a, b) : \text{NWD}(a, b) = 1\}$, gdzie NWD oznacza największy wspólny dzielnik.
6. Zbadaj własności podanej relacji (zwrotność, przeciwzwrotność, symetria, przeciwsymetria, przechodniość, antysymetria):
 - (a) r jest relacją binarną w zbiorze liczb naturalnych taką, że $x r y$ wttw istnieje różna od 1 liczba naturalna, która jest dzielnikiem zarówno x , jak i y ,
 - (b) r jest relacją binarną w zbiorze liczb $\{1, 2, 3, \dots, 9\}$ taką, że $x r y$ wttw $x - y$ jest liczbą parzystą,
 - (c) r jest relacją binarną w zbiorze liczb naturalnych taką, że $x r y$ wttw liczba jedynek w binarnej reprezentacji liczby x jest mniejsza niż liczba jedynek w binarnej reprezentacji liczby y .
7. Niech $P(n)$ będzie programem z jednym argumentem wywołania będącym liczbą całkowitą i zwracającym również liczbę całkowitą. W zbiorze liczb całkowitych \mathbb{Z} określamy relację r taką, że $a r b$ wttw $b \in \text{Res}(P(a))$, gdzie $\text{Res}(P(a))$ jest zbiorem wszystkich wartości, które może zwrócić program P dla danej początkowej a . Określ własności relacji r oraz wyznacz $\text{Res}(P(4))$, gdy
 - (a) $P(n) = \{x := n; \text{return } x\}$,
 - (b) $P(n) = \{x := n + 1; \text{return } x\}$,
 - (c) $P(n) = \{x := \text{random}(\mathbb{N}); \text{return } x\}$, gdzie $\text{random}(X)$ jest akcją losującą dowolną liczbę ze zbioru X ,
 - (d) $P(n) = \{x := \text{random}(\{0, 1, 2, \dots, n\}); \text{return } x\}$,
 - (e) $P(n) = \{\text{if } 3|n \text{ then } x := 0 \text{ else if } 3|(n+1) \text{ then } x := 2 \text{ else } x := 1; \text{fi fi}; \text{return } x\}$.
8. Niech U będzie zbiorem wszystkich możliwych stanów gry "Kółko i krzyżyk". Powiemy, że stan gry S_i jest w relacji r ze stanem gry S_j wtedy i tylko wtedy, gdy planszę stanu S_j można otrzymać z planszy stanu S_i przez jednokrotne lustrzane odbicie planszy stanu S_i względem jednej z jej krawędzi. Określ własności relacji $r \subseteq U \times U$.

9. Rozważmy algorytm

$$Alg(n) = \{if\ n > 0\ then\ if\ n\ mod\ 2 = 0\ then\ Alg(n/2);\ else\ Alg(n - 1);\ fi\ fi\}.$$

Niech U będzie zbiorem wszystkich wykonań algorytmu Alg , dla $n \in \mathbb{N}$. Powiemy, że wykonanie algorytmu $Alg(i)$ jest w relacji r z wykonaniem algorytmu $Alg(j)$ wtedy i tylko wtedy, gdy wykonanie $Alg(i)$ jest rekurencyjnie osiągalne z wykonania $Alg(j)$. Określ własności relacji $r \subseteq U \times U$.

10. Relacja r określona w zbiorze X jest euklidesowska, gdy dla dowolnych $x, y, z \in X$, jeśli $x r y$ i $x r z$, to również $y r z$. Sprawdź, która z relacji spełnia ten warunek.

- (a) $r \subset 2^{\mathbb{N}} \times 2^{\mathbb{N}}$, $A r B$ wttw, gdy $A \cap B = \emptyset$,
- (b) $r \subset \mathbb{Z}^3 \times \mathbb{Z}^3$, $(x_1, x_2, x_3) r (y_1, y_2, y_3)$ wttw, gdy $x_2 = y_2$.

11. Sprawdź, czy relacja r określona w zbiorze X jest relacją równoważności. Jeśli tak, to wyznacz jej klasy abstrakcji.

- (a) X - zbiór miast leżących w Europie, $r = \{(x, y) : x \text{ jest miastem położonym w tym samym państwie, co miasto } y\}$,
- (b) X - zbiór studentów wszystkich warszawskich uczelni, $r = \{(x, y) : x \text{ studiuje na tej samej uczelni, co } y\}$,
- (c) $X = \{x, y, z\}$, $r = \{(x, x), (y, y), (y, z), (z, y), (z, z)\}$,
- (d) $X = \mathbb{Z}$, $r = \{(x, y) : (x - y)(x + y) = 0\}$,
- (e) $X = \mathbb{Z}$, $r = \{(x, y) : x - y \text{ jest podzielne przez } 3\}$,
- (f) $X = \mathbb{N}$, $r = \{(x, y) : xy = 2k \text{ dla } k \in \mathbb{Z}\}$,
- (g) $X = \mathbb{N}$, $r = \{(x, y) : \max\{x, y\} = x\}$,

12. Sprawdź, czy relacja r określona w zbiorze X jest relacją równoważności. Jeśli tak, to wyznacz jej klasy abstrakcji.

- (a) $X = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, $(x_1, y_1) r (x_2, y_2)$ wttw, gdy $x_1 + y_2 = y_1 + x_2$,
- (b) $X = \mathbb{Z} \setminus \{0\} \times \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $(x_1, y_1) r (x_2, y_2)$ wttw, gdy $x_1 y_2 = y_1 x_2$.

13. Niech U będzie zbiorem programów deterministycznych z jednym argumentem wywołania będącym liczbą całkowitą i zwracającym również liczbę całkowitą. W zbiorze U określamy relację r taką, że $P_1 r P_2$ wttw $P_1(z) = P_2(z)$ dla każdego $z \in \mathbb{Z}$ (programy P_1 i P_2 zwracają tę samą wartość dla tych samych danych początkowych). Czy r jest relacją równoważności? Odpowiedź uzasadnij.

14. Niech P będzie programem deterministycznym z jednym argumentem wywołania będącym liczbą całkowitą i zwracającym również liczbę całkowitą. W zbiorze liczb całkowitych \mathbb{Z} określamy relację r taką, że $z_1 r z_2$ wttw $P(z_1) = P(z_2)$ (wartości zwrócone przez program P dla liczb z_1 i z_2 są identyczne). Czy jest to relacja równoważności? Jeśli tak, to opisz klasę abstrakcji, której reprezentantem jest liczba 5, jeśli

- (a) $P(z) = \{x := z \text{ mod } 3; \text{ return } x\}$,
- (b) $P(z) = \{x := |z|; \text{ return } x\}$,
- (c) $P(z) = \{x := \min\{0, z\}; \text{ return } x\}$,
- (d) $P(z) = \{if\ z|10\ then\ x := 1\ else\ x := 0; \text{ return } x\}$.

15. Niech $U = \{Alg_1, Alg_2, Alg_3, Alg_4, \dots\}$ będzie zbiorem wszystkich skończonych jednoargumentowych algorytmów rekurencyjnych, gdzie argumentem wywołania dowolnego algorytmu $Alg \in U$ jest pewna liczba $n \in \mathbb{N}$. Powiemy, że algorytm Alg_i jest w relacji r z algorytmem Alg_j wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją liczby $n_i, n_j \in \mathbb{N}$ takie, że drzewo wywołań rekurencyjnych algorytmu $Alg_i(n_i)$ ma taki sam kształt jak drzewo wywołań rekurencyjnych algorytmu $Alg_j(n_j)$. Określ własności relacji $r \subseteq U \times U$. Dodatkowo, jeżeli r jest relacją równoważności w uniwersum U , to podaj dowolny algorytm rekurencyjny należący do klasy abstrakcji elementu:

- (a) $Alg(n) = \{if\ n > 0\ then\ Alg(n \text{ div } 3); \text{ fi}\}$,

- (b) $Alg(n) = \{ \text{if } n > 0 \text{ then } Alg(n-1); Alg(n-1); fi \},$
- (c) $Alg(n) = \{ \text{if } n > 1 \text{ then } Alg(n-1); Alg(n-2); fi \},$
- (d) $Alg(n) = \{ \text{if } n > 1 \text{ then } Alg(n-1); Alg(n-2); Alg(n-3); \dots; Alg(0); fi \}.$

16. Rozważmy algorytm

$$Alg(n) = \{ i := 1; \text{ while } i < n \text{ do } i := 3 \cdot i; \text{ od} \}.$$

Niech U będzie zbiorem wszystkich wykonań algorytmu Alg , dla $n \in \mathbb{N}_+$. Powiemy, że wykonanie algorytmu $Alg(i)$ jest w relacji r z wykonaniem algorytmu $Alg(j)$ wtedy i tylko wtedy, gdy liczba iteracji pętli while wykonania $Alg(i)$ jest równa liczbie iteracji pętli while wykonania $Alg(j)$. Określ własności relacji $r \subseteq U \times U$. Dodatkowo, jeżeli r jest relacją równoważności w uniwersum U , to podaj klasę abstrakcji elementu:

- (a) $Alg(2)$,
- (b) $Alg(34)$,
- (c) $Alg(k)$, gdzie $k \in \mathbb{N}_+$.

17. Niech $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ oraz niech r_1 i r_2 będą dwiema relacjami binarnymi w A : $r_1 = \{(x, y) \in A \times A : y \equiv (x + 4) \pmod{6}\}$, $r_2 = \{(x, y) \in A \times A : x \text{ jest najmniejszą liczbą nieparzystą większą niż } y\}$. Wyznacz r_1^{-1} . Narysuj graf relacji złożonej $r_1 \circ r_2$. Czy relacja $r_2 \circ r_1$ jest identyczna z relacją $r_1 \circ r_2$?

18. Rozważmy trzy niedeterministyczne programy:

$$P_1(z) = \{ x := \text{random}(\{0, 1, 2, 3\}); y := x + z; \text{ return } y \},$$

$$P_2(z) = \{ \text{if } z \bmod 2 = 0 \text{ then } y := \frac{y}{2} \text{ else } y := \text{random}(\{0, 1\}); \text{ return } y \},$$

$$P_3(z) = \{ x := P_1(z); y := P_2(x); \text{ return } y \}.$$

W zbiorze $\{-3, 0, 1, 2\}$ definiujemy trzy relacje r_i , dla $i \in \{1, 2, 3\}$ takie, że $a r_i b$ wttw $b \in Res(P_i(a))$, gdzie $Res(P_i(a))$ jest zbiorem wszystkich możliwych wyników programu P_i uzyskanych dla wartości początkowej a .

- (a) Wyznacz dziedzinę i przeciwdziedzinę relacji r_1 i r_2 .
- (b) Wskaż zależność pomiędzy relacją r_3 i relacjami r_1 i r_2 .
- (c) Wyznacz r_1^{-1} , r_2^{-1} , r_3^{-1} .
- (d) Wyznacz $(r_1 \circ r_2) \circ r_3^{-1}$.

19. Niech r będzie relacją binarną określoną w zbiorze U . Udowodnij, że:

- (a) jeśli relacja r jest symetryczna, to relacja r^{-1} też jest symetryczna,
- (b) jeśli relacje r_1 i r_2 są antysymetryczne, to relacja $r_1 \cap r_2$ też jest antysymetryczna,
- (c) jeśli relacje r_1 i r_2 są zwrotne, to relacja $r_1 \circ r_2$ też jest zwrotna.

20. Niech r , s i u będą relacjami binarnymi określonymi w zbiorze U . Zbadaj prawdziwość podanych zdań:

- (a) Jeżeli r i s są relacjami przechodnimi, to ich przecięcie $r \cap s$ też jest relacją przechodnią.
- (b) Jeżeli $r \cap s$ jest relacją przechodnią, to obie relacje r i s są przechodnie.
- (c) Jeżeli relacje r i s są symetryczne, to ich suma $r \cup s$ jest relacją symetryczną.
- (d) Jeżeli suma $r \cup s$ relacji jest relacją symetryczną, to każda z relacji r , s musi być symetryczna.